



COLOQUE LA FOTOGRAFÍA AQUÍ

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha nacimiento: \_\_\_\_\_

Alergia a: \_\_\_\_\_

Peso: \_\_\_\_\_ libras Asma: **Sí (mayor riesgo de una reacción grave)** **No**

NOTA: No dependa de antihistamínicos o inhaladores (broncodilatadores) para tratar una reacción grave. USE LA EPINEFRINA.

Situación/circunstancia especial - Si se marca esta casilla, el niño(a) tiene una alergia extremadamente grave a los siguientes alimentos \_\_\_\_\_.

Incluso si el niño(a) tiene síntomas LEVES después de comer (ingerir) estos alimentos, administre la epinefrina inmediatamente.  Sí /  No / Layout B... tos repetitiva

**CORAZÓN**

Piel pálida o azulada, debilidad, pulso débil, mareo

**GARGANTA**

Garganta cerrada o ronca, problemas . 31 TJEMC /P Lang (es-ES)/MCID 7 BDC 0 -1.1 D00440051004400C0004F0044005B004C004

- 3. Vigile de cerca a la persona para detectar cambios. Si los síntomas empeoran, administre la epinefrina.

**MEDICAMENTOS/DOSIS**

Epinefrina de marca o genérica: \_\_\_\_\_

Dosis de epinefrina: 0.1 mg IM 0.15 mg IM 0.3 mg IM

Antihistamínico de marca o genérico: \_\_\_\_\_

Dosis del antihistamínico: \_\_\_\_\_

Otro (p. ej., inhalador-broncodilatador si hay sibilancia): \_\_\_\_\_

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE O PADRE/MADRE/TUTOR

FECHA

FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

FECHA



**CÓMO USAR SYMJEPI™ (INYECCIÓN DE EPINEFRINA, USP)**

1. Cuando esté listo para inyectar, quite la tapa para exponer la aguja. No coloque un dedo en la parte superior del dispositivo.
2. Sostenga la SYMJEPI™ con los dedos únicamente e inserte lentamente la aguja en el muslo. SYMJEPI™ puede inyectarse a través de la ropa de ser necesario.
3. Después de insertar la aguja en el muslo, empuje el émbolo hasta el fondo, hasta que escuche un chasquido y sosténgalo durante 2 segundos.
4. Retire la jeringa y aplique un masaje al área de la inyección durante 10 segundos. Llame al 911 y busque ayuda médica de emergencia inmediatamente.
5. Después de administrar la jeringa, use una mano con los dedos detrás de la aguja para deslizar la guarda de seguridad sobre la aguja.